

Es un fertilizante elaborado con Nitrógeno, Fósforo y Potasio los cuales se caracterizan por ser la única fracción soluble en medios ácidos, neutro y alcalino que indica la máxima efectividad de tanto aplicados al follaje como a las raíces de las plantas.



Precauciones y advertencias de uso.

- Use el equipo de protección adecuado durante su uso y aplicación; overol, impermeable de mangas largas, guantes impermeables, lentes de seguridad, botas, gorra y mascarilla o cubre boca.
- Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa.
- No coma, beba o fume durante el uso y manejo del producto. Lávese las manos y la cara antes de comer, beber o fumar.
- No aplique en contra del viento, ni cuando éste favorezca el acarreo del producto.
- Al terminar las labores diarias, báñese con abundante agua y jabón, póngase ropa limpia.
- Lave bien con agua y jabón su ropa protectora contaminada, antes de volver a usarla
- Lávese antes de comer, beber o fumar.



Primeros auxilios

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica. Mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios.

Si ha habido contacto con la piel, quite inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua y jabón.

Si ha habido contacto con los ojos, inmediatamente lave éstos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

En caso de que el producto haya sido ingerido, y si el paciente está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando dos o tres vasos de agua.

Repita esta operación hasta que el vómito sea claro.

Si el paciente no respira, proporcione de inmediato la respiración artificial.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA



Medidas de protección al ambiente.

Evite la contaminación de lagos, ríos, arroyos, estanques y cualquier fuente o depósito de agua, ya sea por aplicación directa, acarreo del producto por el viento, lavado del equipo de aplicación o eliminación de sobrantes.

Destruya los envases vacíos. El proceso de destrucción e inutilización de los envases deberá realizarse conforme a la legislación aplicable.



Condiciones de almacenamiento y transporte

Guarde este producto en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, en un almacén aislado y bajo llave. Este local debe ser seco, fresco y bien ventilado

Ordene perfectamente las estibas en el almacén, utilizando tarimas para este

La altura de las estibas se debe limitar al máximo tolerable sin que los empaques de los envases de la parte inferior se dañen.

No se debe cargar este producto en vehículos que transporten viajeros, animales, alimentos u otras materias para consumo o empleo humano y animal.

Este producto debe mantenerse alejado del calor y del fuego directo.

Se deben cargar y descargar los envases con cuidado. Nunca poner encima otras mercancías pesadas que pudieran aplastarlos, ni tampoco dejarlos caer desde lo alto.

Deben eliminarse del vehículo de carga, clavos salientes, tiras metálicas y astillas que puedan perforar los envases y producir derrames.

Este producto debe transportarse en envases cerrados. Este producto debe almacenarse por separado de herbicidas para evitar contaminación cruzada.



Garantia

ROYAL GARDEN, S.A. DE C.V. Garantiza la composición de ABONO DE BORREGO, sin embargo no se responsabiliza de los resultados del producto, ya que el manejo, transporte, almacenamiento, dosificación y aplicación de este producto están fuera de su control.



Analisis Garantizado

Nitrógeno Total 20.5%



Advertencias sobre riesgos

SULFATO DE AMONIO ®, es un mejorador de suelos que aumenta la retención del agua y aporta nutrientes equivalentes a una fórmula balanceada, se recomienda aplicar en suelos arenosos arcillosos usando la siguiente escala como guía y ajustando según las necesidades específicas del caso. Un suelo arcilloso requerirá menos que un arenoso. También las áreas de mayor tráfico requerirán de mayor aplicación de riego



Dosis, instrucciones de uso y aplicación

El contenido de la bolsa alcanza para una superficie de 15 m2. Las hojas deberán estar libres de rocío.

Aplique alrededor de la planta uniformemente de 15 a 20 grs. Dependiendo del tamaño de la misma.

Aplicar en etapas de crecimiento de 250 hasta 500 grs. Según el tamaño del arbol.

PLANTAS DE INTERIOR:

- 1.- Macetas aplicar hasta 100 gr., si estas son medianas o grandes. 2.- Aplicar ell fertilizante en el suelo nunca en el follaje y alejado del tronco o
- - NO aplique más de lo indicado.
- 3.- No alphque l'ias de la indicado.
 4.- Repita la aplicación cada mes ASEGURESE.
 5.- Mantenga el producto alejado de los niños.

Este producto no deja residuos, no crea parásitos, ni atrae insectos, no tiene olores penetrantes y es seguro en su uso.



Epoca de aplicación

Este fertilizante puede ser aplicado en cualquiera de los doce meses del año.



N Incompatibilidad

SULFATO DE AMONIO, se debe aplicar solo, sin ser mezclado con otros productos.



Contraindicaciones

SULFATO DE AMONIO, no debe aplicarse sin el equipo de protección personal que consta de guantes y cubre boca.